

Pónganse al día con las vacunas de rutina

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes han perdido la oportunidad de recibir las vacunas de rutina. Los expertos estiman que 1 de cada 5 niños en edad escolar en los EE. UU. están atrasados con las vacunas para protegerlos de enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (varicela), según [Learning First Alliance](#)".

Las vacunas de rutina protegen a sus niños y a su comunidad de enfermedades prevenibles. Es importante que los cuidadores colaboren con el médico de sus niños para asegurarse de que se pongan al día con la atención médica rutinaria, incluyendo las vacunas que no han recibido.



Llamen a su médico o a su clínica local para asegurarse de que sus estudiantes están al día con las vacunas.

Los requisitos de vacunación para entrar en la escuela varían de un estado a otro. Consulten al departamento de salud de su estado o a su distrito escolar local.

Vacunas recomendadas por los CDC para niños en edad escolar

- 4 A 6 AÑOS**
- Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP) (5a dosis)
 - Polio (IPV) (4a dosis)
 - Sarampión, paperas y rubeola (MMR) (2a dosis)
 - Varicela (2a dosis)
 - Influenza (Gripe) (cada año)

- 7 A 10 AÑOS**
- Influenza (Gripe) (cada año)
 - VPH (dos dosis)*

* Aunque se recomienda para niños de 11 a 12 años, la vacuna contra el VPH puede administrarse a partir de los 9 años para ayudar a proteger tanto a las niñas como a los niños de la infección por el VPH y de los cánceres causados por el VPH.

- 11 A 12 AÑOS**
- Influenza (Gripe) (cada año)
 - Enfermedad meningocócica (una dosis de la vacuna MenACWY)
 - VPH (dos dosis)
 - Tétanos, difteria y tos ferina (una dosis de la vacuna Tdap)
 - COVID-19* (dos dosis)

* A los 12 años, los CDC recomiendan la vacuna contra COVID-19. La vacuna contra COVID-19 y las otras vacunas pueden administrarse a sus niños el mismo día.

- 13 A 18 AÑOS**
- Influenza (Gripe) (cada año)
 - Enfermedad meningocócica
 - Meningocócica conjugada (MenACWY) administrado a los 16 años (2ª dosis).
 - Antimeningocócica del serogrupo B (MenB) puede administrarse, preferiblemente entre los 16 a 18 años de edad (2 dosis).